

Prehospitalische fase sepsis



← NEE Verdenking infectie? NEE →

JA JA

1

← NEE ≥ 2 SIRS criteria? NEE →

JA JA

2

← NEE Teken en sepsis NEE →

JA JA



3



Ambulance A1, met interventie naar SEH

Reguliere zorg

Reguliere zorg

Aandachtspunten: leeftijd, comorbiditeit,
beta-blockers, immuunsuppressiva

Aandachtspunten: leeftijd, comorbiditeit,
beta-blockers, immuunsuppressiva

Overweeg
antibiotica

Overweeg
antibiotica

Hospitale fase sepsis



Triage

4

← NEE Infectie en ≥ 2 SIRS
of ≥ 2 qSOFA criteria? NEE →

JA

Sepsis protocol

binnen één uur na triage

Sepsis is een reactie van het lichaam op een infectie.
Hierdoor kan iemand ernstige ziekteverschijnselen krijgen.
Dit stroomschema helpt u bij de verdenking van sepsis.

Sepsis

1 SIRS criteria

- Ademfrequentie > 20 ademhalingen per minuut
- Hartfrequentie > 90 hartslagen per minuut
- Temperatuur < 36°C of > 38°C
- Leuco <4 of >12 óf >10% staven

2 Tekenen sepsis

- Zieke patiënt
- Zuurstofsaturatie < 90%
- Systolische bloeddruk ≤ 100 mmHg
- Gemarmerde huid
- Plotselinge verwardheid en/ of verandering bewustzijn

3 Interventie RAV

- Zuurstof geven (streefsaturatie 94% tot 98%)
- 2x venflon, minimaal 1 venflon
- Minimaal 500 ml Ringerlactaat
of meer indien systolische bloeddruk ≤ 100 mmHg

4 qSOFA criteria

- Ademfrequentie ≥ 22/min
- Systolische bloeddruk ≤ 100 mmHg
- Veranderd bewustzijn

www.nazb.nl

Sepsis protocol

binnen één uur na triage

- Uitgebreid laboratoriumonderzoek inclusief lactaatbepaling
- (bloed)kweken
- NaCl 0,9% / Ringerlactaat
- Antibiotica
- Focusonderzoek



nazb

netwerk acute zorg brabant